

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-8-72 415150

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67-070 - STRASBOURG - CEDEX

Supplément n° 5 au Bulletin n° 143 du mois d'Août 1972

25 Août 1972

### HOUBLON

#### MILDIOU

Les conditions climatiques anormales qui ont intéressé nos régions au cours de ces derniers jours, furent extrêmement favorables au développement du Mildiou du houblon. L'hygrométrie élevée au niveau des houblonnières et les températures minimales très basses pour la saison, ont permis au champignon de s'installer sur cônes, dans les houblonnières où les traitements ont été réalisés irrégulièrement (matériel de traitement mal adapté pour assurer une protection correcte de l'extrémité des lianes, traitement à la lance trop rapide laissant des vides, etc...).

Cette situation n'est pas alarmante. Cependant, les brumes et rosées matinales sont maintenant à même de provoquer une apparition brutale de Mildiou.

Il est urgent de renouveler le traitement dans l'ensemble des houblonnières, même dans celles proches de la récolte et où la maladie est inexistante.

Nous insistons sur le fait que la pulvérisation doit être soignée et que les doses de produit doivent être respectées sans, pour autant, les augmenter. En cette période de pré-récolte, éviter l'emploi des produits cupriques.

#### PUCERONS

Sauf cas particuliers, il est inutile d'ajouter un produit aphicide à la bouillie Mildiou.

### VIGNE

#### POURRITURE GRISE (BOTRYTIS)

Le Botrytis s'est installé dans l'ensemble du vignoble. Les grappes porteuses de quelques grains violacés, peuvent être très facilement décelées.

Cette attaque est considérée comme très précoce, surtout si l'on considère qu'elle intervient avant la véraison dans la majorité des parcelles.

Le traitement recommandé dans notre dernière Note (17 Août) devra être effectué dès à présent, sans attendre l'arrivée de la véraison.

Lors des travaux de rognage, assurer une bonne aération des grappes.

.../...

204

## CULTURES MARAICHERES

### TOMATES

Nos abonnés ont pu lire dans la presse locale et notamment dans le journal "L'ALSACE", la mise au point faite par Messieurs VUITTENEZ A. et PUTZ C. de la Station de Pathologie Végétale de COLMAR (I.N.R.A.) concernant les affections virales observées dans un grand nombre de plantations de tomates de plein champ en ALSACE. La détermination du ou des agents en cause, est en cours.

Les tomates atteintes par cette maladie, présentent des taches arrondies, blanchâtres ou brunâtres assez imprimées dans le fruit. Par la suite, la Pourriture s'y installe.

Les pieds atteints flétrissent et dessèchent brusquement.

Tout ce que l'on peut préconiser actuellement, est l'arrachage des plantes atteintes et leur destruction par le feu. Il ne faut pas jeter les plants malades sur le fumier ou en faire un compost.

Fort heureusement, toutes les plantations à l'intérieur de notre Circonscription ne sont pas atteintes. Dans les parcelles où cette affection n'est pas observée, un traitement fongicide visant à assurer la protection des tomates vis-à-vis du Mildiou devra être réalisé dès que possible.

### POIREAU

#### TEIGNE DU POIREAU

Les vols des papillons de Teigne du poireau se poursuivent. Renouveler le traitement insecticide des cultures de poireaux, dans la période du 28 au 30 Août. Avoir soin d'ajouter un mouillant à la bouillie.

Dans le choix du produit, tenir compte des délais d'emploi avant la récolte (consulter notre Note du 14 Août).

### ARBUSTES A PETITS FRUITS

#### CASSISSIERS - GROSEILLIERS

#### ANTHRACNOSE

De nombreuses plantations de cassissiers et de groseilliers sont atteintes plus ou moins gravement par l'Anthracnose. Cette maladie provoque une chute prématurée du feuillage. Des recherches récentes mettent en évidence que la défeuillaison précoce de ces arbustes à petits fruits a une incidence très nette sur l'induction florale. Il faut donc rechercher à conserver un feuillage sain, le plus tardivement en saison. Ainsi, un traitement fongicide est-il vivement recommandé.

Utiliser : le Mancozèbe à 160 g de M.A./hl ou un produit cuprique apportant 150 g de Cuivre par hectolitre.

#### OIDIUM DU CASSISSIER

L'Oïdium se manifeste sur cassissiers, notamment en LORRAINE.

Profiter de l'intervention contre l'Anthracnose pour lutter contre cette maladie. Utiliser le Bénomyl à 30 g de M.A./hl ou le Dinocap à 25 g de M.A./hl + un mouillant. S'assurer de la compatibilité des produits avant mélange.

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles :  
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la  
Circonscription Phytosanitaire  
"ALSACE et LORRAINE"  
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 4 au Bulletin n° 143, publié le 17 Août 1972.